



Il/la paziente dovrà presentarsi presso questo servizio per effettuare **UROGRAFIA a DIGIUNO ALMENO DALLA SERA PRECEDENTE** munito, oltre che della documentazione clinica e radiologica precedente inerenti il suo caso clinico, dei risultati – non oltre un mese – delle seguenti indagini diagnostiche:

- **CREATININEMIA + ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE**

#### **PREPARAZIONE:**

**PER TRE GIORNI PRECEDENTI L'ESAME:** assumere SIMECRIN 120 - 1 confetto al giorno.

**IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:**

-a **colazione:** si possono assumere tè o succhi di frutta.

-a **pranzo e cena:** si possono mangiare cibi solidi.

#### **MODALITA' DI ASSUNZIONE**

Una confezione di **MOVIPREP gusto arancio** è utile per la preparazione di 2 litri di soluzione: 1 litro di MOVIPREP si prepara mescolando insieme una bustina A ed una bustina B in 1 litro d'acqua fino a completo scioglimento (il preparato può essere posto in frigorifero).

**La soluzione deve essere assunta nell'arco di un'ora, bevendo rapidamente una tazza piena ogni 10-15 minuti. Per completare la preparazione, si deve bere obbligatoriamente anche un litro di acqua** (in alternativa si può scegliere un litro di thè o di camomilla). Ripetere l'assunzione con un secondo litro di MOVIPREP.

**Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di MOVIPREP** tra le 18.00 e le 19.00 e, successivamente cenare.

Bere il **secondo litro di MOVIPREP** tra le 21.00 e le 22.00 e successivamente **bere 1 litro di acqua**, è anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, thè, camomilla).

**AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
DELLA CASA DI CURA SALUS BRINDISI  
Via Appia, 366 – 72100 BRINDISI**

**RICHIESTA PER ESAMI RADIOLOGICI CON MEZZI DI CONTRASTO (MDC)**

(Elaborata secondo la Nota Min. San.-17.09.1997 e le Linee Guida dell' European Society of Urogenital Radiology e della Società Italiana di Radiologia medica).

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. tel \_\_\_\_\_

Esame richiesto \_\_\_\_\_ Quesito clinico \_\_\_\_\_

Si dichiara quanto segue:

- |     |   |    |    |
|-----|---|----|----|
| 1)  | Il paziente ha già effettuato esami con mezzo di contrasto<br><i>se si indicare quali</i> _____                                   | SI | NO |
| 2)  | Precedenti reazioni allergiche al mezzo di contrasto  | SI | NO |
| 3)  | Allergia trattata farmacologicamente<br><i>se si indicare quale</i> _____   | SI | NO |
| 4)  | Asma  | SI | NO |
| 5)  | Ipertiroidismo  | SI | NO |
| 6)  | Insufficienza cardiaca grave ( <i>se si allegare ecocardio</i> )  | SI | NO |
| 7)  | Diabete   | SI | NO |
| 8)  | Insufficienza renale (creatininemia _____)  | SI | NO |
| 9)  | Ipertensione arteriosa  | SI | NO |
| 10) | Il paziente assume biguanidi (metformina)<br><i>se si deve sospendere il farmaco 48 ore prima e dopo l'esecuzione dell'esame!</i> | SI | NO |
| 11) | Il paziente assume abitualmente qualcuno dei seguenti farmaci   |    |    |
|     | - Interleukina 2  | SI | NO |
|     | - Antinfiammatori non steroidei   | SI | NO |
|     | - Aminoglicosidi  | SI | NO |
|     | - Beta-bloccanti  | SI | NO |
|     | - farmaci nefrotossici ( <i>quali?</i> _____)   | SI | NO |

timbro e firma leggibile  
del medico curante

Firma del Paziente  
o del Titolare del consenso

data \_\_\_\_\_

**In caso di precedenti reazioni allergiche al MDC o a FARMACI o di allergie in trattamento** eseguire preparazione desensibilizzante; si consiglia il seguente schema:

***prednisone 50mg per os 13 ore, 7 ore e 1 ora prima dell'esame diagnostico***

***cetirizina 10 mg 1 ora prima dell'esame diagnostico***

***pantoprazolo 40 mg 13 ore prima dell'esame diagnostico***

**I pazienti con asma** devono essere valutati dall' Anestesista della Radiologica Salus.

**Esclusivamente** nei casi di accertata e grave allergia al mdc, l'eventuale sospensione di farmaci **B-bloccanti** sarà contemplata e valutata dal Cardiologo curante insieme all'Anestesista e al Radiologo della Radiologica Salus che contestualmente ne accerterà l'appropriatezza e l'indispensabilità dell'esame.

## NOTA INFORMATIVA PER IL MEDICO CURANTE

Egregio Collega,

il questionario clinico-anamnestico sul retro di questa pagina, formulato secondo le Linee Guida dell'ESUR\* e della SIRM \*\*, ottempera alla disposizione della nota del Ministero della Sanita' del 17-09-1997 nella quale *"si ritiene che la valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente da sottoporre ad indagine con mezzi di contrasto da parte del medico curante, che richiede l'esame, e da parte del radiologo, che esegue l'esame, rappresenti per la prevenzione il momento piu' importante"*.

Resta peraltro inteso che la valutazione dei criteri di appropriatezza dell'indagine richiesta e' appannaggio dello specialista radiologo, al quale e' deputata la scelta della metodica e del mezzo di contrasto più idonei, sulla base della sua personale esperienza e della valutazione del rapporto costo- beneficio. (D.L. n° 187 del 26-05-2000; Conf. Perm. Rapp. Stato-Regioni: Accordo 28-10-2004).

**Questo modulo dovrà pervenire via FAX O e-mail a questo Dipartimento di Diagnostica per Immagini, almeno una settimana prima dell'esame, e dovrà essere consegnato in copia originale al momento dell'esame.**

**\*fax:0831-516913**

**e-mail : segr.imm@casadicurasalus.it**

**Riservato ai pazienti con precedenti di reazioni allergiche al mezzo di contrasto e a farmaci o con allergie in trattamento.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver eseguito la terapia desensibilizzante prescrittagli dal Medico curante.

In fede

\_\_\_\_\_

\* European Society of Urogenital Radiology