



ESAME RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO

Il/la paziente dovrà far compilare l'allegato **modulo di richiesta**, che porterà a controllo presso la nostra segreteria, almeno 1 settimana prima dell'esame, per riconsegnarlo al momento dell'esame stesso compilato in tutte le sue parti dal proprio medico curante.

Il/la paziente dovrà inoltre portare tutte le indagini precedenti inerenti all'esame.

Il/la paziente dovrà osservare il digiuno da almeno 6 ore prima dell'esame; può bere acqua.

Esami di laboratorio:

- Creatininemia



PREPARAZIONE PER ENTERO RMN (RM delle anse intestinali / RM addome completo cmc)

Per l'esecuzione della risonanza delle anse intestinali (ENTERO-RMC) è necessario eseguire la seguente preparazione il giorno precedente l'esame:

ORE 08.00: 6 compresse di Pursennid da assumere durante la colazione abituale, meglio se con caffè, tè o latte.

ORE 13.00: Pranzo con indicativamente solo i seguenti alimenti:

- 70g di pasta condita con olio e formaggio grana;
- 150g di carne ai ferri;
- 1 mela.

ORE 16.30: 1 Litro di acqua con SELG-ESSE (1 Bustina da 70g)

ORE 17.30: 1 Litro di acqua con SELG-ESSE (1 Bustina da 70g)

ORE 20.00: Cena solamente con brodo vegetale filtrato e liquidi eventualmente zuccherati. Sono vietati liquidi gassati, succhi di frutta e/o preparazioni industriali.

Il giorno dell'esame occorre presentarsi **a digiuno dalle 6 ore precedenti l'esame**, ad eccezione delle terapie mediche in corso da regolamentare a giudizio del medico curante (es. insulina, ipoglicemizzanti orali, anti-iperlensivi...).

IMPORTANTE:

È indispensabile assicurarsi presso il medico curante che non ci siano controindicazioni all'assunzione di BUSCOPAN (glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache, ...).

Occorre presentarsi 60 minuti prima dell'esecuzione dell'esame e portare con sé:

- **2 bustine da 70g di SELG-ESSE**
- **L'esame del sangue creatinina;**
- **1 Bottiglia d'acqua da 2 lt.**



**AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DELLA CASA DI CURA SALUS BRINDISI**

Data _____

Via Appia, 366 – 72100 BRINDISI

RICHIESTA PER RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO

(Elaborata secondo la Nota Min. San. 17.09.1997 e Linee Guida dell'European Society of Urogenital Radiology).

Cognome e nome _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ tel _____

ESAME RICHIESTO _____

MOTIVO DELL'ESAME _____

Si dichiara quanto segue:

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | a) Il/la paziente ha già effettuato RM con mezzo di contrasto? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| | b) <i>Se si al punto a)</i> il /la paziente ha avuto storie di moderate o severe reazioni al mezzo di contrasto per risonanza magnetica? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 2. | storia di allergie che richiedono trattamento | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3. | storia di asma | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4. | storia di emosiderosi o emocromatosi | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5. | precedenti reazioni al destrano | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 6. | il paziente assume Beta-bloccanti | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 7. | insufficienza renale (creatininemia _____) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Timbro e firma leggibile
del medico curante

Firma del paziente o
del titolare del consenso

In caso di precedenti reazioni allergiche al MDC o a FARMACI o di allergie in trattamento eseguire preparazione desensibilizzante; si consiglia il seguente schema:

prednisone 50mg per os 13 ore, 7 ore e 1 ora prima dell'esame diagnostico

cetirizina 10 mg 1 ora prima dell'esame diagnostico

pantoprazolo 40 mg. 13 ore prima dell'esame diagnostico

I pazienti con asma devono essere valutati dall'Anestesista della Radiologica Salus.

La eventuale sospensione di farmaci B-bloccanti va contemplata e valutata dall'Anestesista della Radiologica Salus insieme al cardiologo curante, **esclusivamente** nei casi di accertata e grave allergia al mdc, previo accertamento dell'appropriatezza e indispensabilità dell'esame.

NOTA INFORMATIVA PER IL MEDICO CURANTE

Egregio Collega,

il questionario clinico-anamnestico sul retro di questa pagina, formulato secondo le Linee Guida dell'ESUR* e della SIRM **, ottempera alla disposizione della nota del Ministero della Sanità del 17-09-1997 nella quale *“si ritiene che la valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente da sottoporre ad indagine con mezzi di contrasto da parte del medico curante, che richiede l'esame, e da parte del radiologo, che esegue l'esame, rappresenti per la prevenzione il momento più importante”*.

Resta peraltro inteso che la valutazione dei criteri di appropriatezza dell'indagine richiesta è appannaggio dello specialista radiologo, al quale è deputata la scelta della metodica e del mezzo di contrasto più idonei, sulla base della sua personale esperienza e della valutazione del rapporto costo- beneficio. (D.L. n° 187 del 26-05-2000; Conf. Perm. Rapp. Stato-Regioni: Accordo 28-10-2004).

Questo modulo e gli esami ematochimici richiesti, devono essere consegnati, almeno una settimana prima dell'esame, al Dipartimento di Diagnostica per Immagini:

- **personalmente presso gli uffici di Segreteria**
- **oppure**
- **via e-mail all' indirizzo: segr.imm@casadicurasalus.it**

La stessa documentazione dovrà essere consegnata anche in originale al momento dell'esame.

Riservato ai pazienti con precedenti di reazioni allergiche al mezzo di contrasto e a farmaci o con allergie in trattamento.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver eseguito la terapia desensibilizzante prescrittagli dal Medico curante.

In fede

* European Society of Urogenital Radiology